

Premedicazione per esecuzione di indagini radiologiche contrastografiche (rif. Documento SIRM-SIAAIC 2018).

Ai medici prescriventi indagini radiologiche che prevedano la somministrazione di mdc

In caso di pazienti che in precedenti esami radiologici contrastografici (Angiografia, TAC o RM) hanno manifestato **reazione allergica al MdC** è indispensabile indicare il nome commerciale del prodotto (indicato nel testo del referto).

Qualora non fosse possibile risalire al nome del prodotto è **indicata** la premedicazione sotto riportata.

PER OS

- Prednisone 50 mg (Deltacortene Forte 2 cp 25 mg) 13, 7 ed 1 ora prima esame
- Cetirizina 10 mg (Zirtec 10 mg) 1 ora prima esame
-

E.V.

- Metilprednisolone 40 mg (Urbason 40 mg) 13, 7 ed 1 ore prima esame
- Clorfenamina 10 mg (Trimeton 10 mg) 1 ora prima esame

In caso di **mastocitosi, angioedema ricorrente, anafilassi idiopatica** è invece indicata la premedicazione sotto riportata

PER OS

- Prednisone 50 mg (Deltacortene Forte 2 cp 25 mg) 12 e 2 ore prima esame
- Cetirizina 10 mg (Zirtec 10 mg)

E.V.

- Metilprednisolone 40 mg (Urbason 40 mg), Clorfenamina 10 mg (Trimeton 10 mg) e Montelukast 10 mg (Singulair 10 mg - per os) 1 ora prima esame

Importante. in caso di asma bronchiale sintomatico e orticaria in atto si consiglia sospensione dell'esame sino a risoluzione completa del quadro. E' utile consigliare al paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione renale del MdC, ed eventuale protezione gastrica, se indicata. Si prega, infine, di specificare sul modulo di Consenso Informato l'avvenuta somministrazione della premedicazione, con timbro e firma del Medico curante/proponente.

Si sottolinea che, in assenza di studi clinici randomizzati, l'utilizzo della premedicazione ha valore empirico e precauzionale (Tramer MR et al, BMJ 2006; Davenport MS et al, Radiol Clin North Am 2017)