

لقاحات كوفيد-19

إنها أدوية تساعد جهاز المناعة (نظام الدفاع في الجسم) على التعرف على الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 وإيقافه ، مما يمنع من التكاثر في أجسامنا. هناك أنواع مختلفة من اللقاحات المصرح بها في أوروبا: حتى لو كانت تعمل بشكل مختلف ، فكل منها يحمينا! لقاحات كوفيد حق لجميع الناس في أراضينا وهي مجانية.

لماذا يتم إعطاء لقاحات كوفيد-19

- لأن جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم تقريباً لا يصابون بـ كوفيد-19
- لأن عدد قليل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ليسوا خطرين
- لأن اللقاحات تحمي كل السكان عن طريق وقف انتشار الفيروس

كم عدد الإدارات التي يجب أن نقوم بها

اعتماداً على نوع اللقاح ، قد تكون هناك حاجة لجرعة واحدة أو جرعتين. إذا تم استخدام اللقاح المكون من جرعتين ، فمن المهم تلقي كلتا الجرعتين حتى تكتمل الحماية.

ماذا يحدث بعد اللقاح؟

بعد التطعيم مباشرة ، سيطلب منك الانتظار 15-30 دقيقة لمعرفة ما إذا كانت لدينا أية شكاوى. في بعض الناس ، يمكن أن يحدث عدم الراحة (الأثار الجانبية). الأثار الجانبية الأكثر شيوعاً خفيفة وتختفي بعد يوم أو يومين: احمرار و / أو ألم في منطقة الحقن ، والتعب ، والصداع ، وآلام العضلات ، والحمى. إذا استمرت هذه المضايقات لأكثر من 3 أيام أو إذا كان لديك آثار جانبية غير متوقعة ، فاتصل بطبيب الأسرة أو المستشفى. في حالة الطوارئ ، اتصل دائماً بالرقم 112 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ.

هل يحمي اللقاح فوراً بعد الحقن؟

لا: الحماية الكاملة تحدث بعد أسبوعين من الجرعة الثانية (في حالة الجرعتين) أو بعد أسبوعين من الجرعة الواحدة.

ماذا تفعل بعد التطعيم

حتى يتم تطعيم معظم السكان (مناعة المجتمع) ، سيستمر الفيروس في الانتشار والدخول والتكاثر في أجسام الناس (العدوى).

يقال اللقاح من خطر الإصابة بالعدوى ولكنه لا يقضي عليها تماماً.

أثناء انتظار توقف الفيروس عن الانتشار ، حتى بعد التطعيم ، من الضروري الاستمرار في الامتثال لجميع تدابير الحماية من كوفيد-19 :

- ارتدِ القناع بشكل صحيح وفقاً لما تتطلبه اللوائح الوطنية
- حافظ على مسافة بين الأشخاص لا تقل عن متر واحد ، وتجنب الازدحام
- اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون أو بمحلول مائي كحولي.