

## Covid-19 冠状病毒病疫苗

疫苗 这些药物可帮助免疫系统（我们身体的防御系统）识别并阻断导致 COVID-19 的病毒，防止其在我们体内繁殖。

欧洲授权的疫苗有多种类型：即使它们的作用不同，但每一种都可以保护我们！抗新冠病毒疫苗是我们领土上所有人的权利，并且是免费的。

### 为什么要接种 COVID-19 疫苗？

- 因为几乎所有接种疫苗的人都没有感染 Covid-19
- 因为接种疫苗的人很少而且不严重
- 因为疫苗通过阻止病毒传播来保护整个人口

### 我们必须进行多少次注射？

根据疫苗的类型，可能需要接种一剂或两剂疫苗。如果使用两剂疫苗，重要的是要接种两剂才能获得完整的保护。

### 接种疫苗后会发生什么？

接种疫苗后，您会立即被要求等待 15-30 分钟，看看我们是否有任何不适。

在某些人中，可能会出现不适（副作用）。最常见的副作用是轻微的，并在 1 或 2 天后消失：注射部位发红和/或疼痛、疲劳、头痛、肌肉酸痛、发烧。

如果这些不适感持续超过 3 天，或者您有意外的副作用，请致电您的家庭医生或卫生局 (AUSL)。在紧急情况下，请始终拨打 112 或前往急诊室。

### 刚刚注射疫苗后是否立即保护我们？

否：完全保护在第二次接种 **2 周后**（如果是 2 剂疫苗）或单次接种后 2 周发生。

### 接种疫苗后该怎么办？

在大多数人口接种疫苗（社区免疫）之前，病毒将继续传播并进入人体并在人体中繁殖（感染）。

疫苗可降低被感染的风险，但并不能完全消除感染。

在等待病毒停止传播的同时，**即使在接种疫苗后，也必须继续遵守所有抗 COVID-19 保护措施：**

- 按照国家规定正确佩戴口罩
- 保持至少 1 米的人际距离
- 避免聚会
- 经常用肥皂和水或水醇溶液洗手。

