



Azienda USL Toscana sud est
SEDE LEGALE: via Curtatone, 54 Arezzo 52100 Arezzo PI e C.F.: 02236310518
SEDE OPERATIVA GROSSETO: via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto
P.O. Misericordia Grosseto U.O.S.D. Medicina Nucleare tel. 0564485032
fax (0564) 485476 e-mail: medicina.nucleare@uslsudest.toscana.it
DIRETTORE DR. SSA LUCIA LELLI

CISTOSCINTIGRAFIA

Grosseto,

SIGNOR

L'esame richiesto verrà effettuato il giorno alle ore circa.

Documentazione richiesta:

- Richiesta medica per "**STUDIO REFLUSSO VESCICO URETERALE CISTOSCINTIGRAFIA**"- codice richiesta 9D41
- Ecografia renale
- Eventuali Cistografie
- Eventuali precedenti Cistoscintigrafie

Attenzione: ai sensi della normativa vigente, nella richiesta medica deve essere indicato un **QUESITO CLINICO**; in caso di mancata indicazione diagnostica l'esame non verrà effettuato.

Preparazione:

- L'esame non necessita di preparazione particolare; non è necessario il digiuno, né la sospensione di eventuali terapie.
- E' eseguibile anche in bambini di pochi mesi di vita e di norma non è necessaria la sedazione.
- L'esame è controindicato in gravidanza.
- Utile la collaborazione dei genitori che saranno invitati a collaborare nel mantenere il bambino fermo, durante l'esecuzione dell'esame.
- Nel caso che la mamma sia in gravidanza, non le sarà permesso di rimanere accanto al bambino per tutta la durata dell'esame e non potrà accudirlo per almeno 24 ore.

Utilità:

L'esame serve a identificare la presenza di reflusso vescico-ureterale e rappresenta una tecnica elettiva nello screening e nel follow up del reflusso vescico-ureterale in età pediatrica; può essere comunque essere effettuata anche in età adulta. La metodica prevede la cateterizzazione vescicale e l'introduzione del radiofarmaco in vescica.

Procedura:

Nel caso si tratti di un bambino, la mattina dell'esame dovrà transitare prima dalla Pediatria per il posizionamento del catetere vescicale (dall'Urologia se si tratta di un adulto). Effettuata questa fase preparatoria scenderà in Medicina Nucleare dove, una volta sdraiato sul lettino di acquisizione, verrà progressivamente riempita la vescica tramite il catetere con una soluzione fisiologica contenente una minima quantità di tracciante radioattivo che consentirà di visualizzare quest'organo ed la presenza di eventuali reflussi ureterali. Durante l'acquisizione il Paziente dovrà rimanere immobile, eventualmente anche con la collaborazione dei genitori. Raggiunto un adeguato riempimento, la vescica potrà essere svuotata e il Paziente potrà tornare in Pediatria (o in Urologia) per togliere il catetere.

Tollerabilità:

Di norma l'esame è ottimamente tollerato e non determina sintomi o effetti collaterali. La dose radioattiva somministrata è minima; si consiglia comunque di evitare il contatto con bambini o con donne in gravidanza per il giorno dell'esame e il successivo.

Re ferto:

Disponibile, in genere, dopo otto giorni dal termine dell'esame.