



Azienda USL Toscana sud est
SEDE LEGALE: via Cuttone, 54 Arezzo 52100 Arezzo P.I. e C.F.: 02236310518
SEDE OPERATIVA GROSSETO: via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto
P.O. Misericordia Grosseto U.O.S.D. Medicina Nucleare tel. 0564485032
fax (0564) 485476 e-mail: medicina.nucleare@uslsudest.toscana.it
DIRETTORE DR.SSA LUCIA LELLI

SCINTIGRAFIA OSSEA "TOTAL BODY"

Grosseto,

SIGNOR

L'esame richiesto verrà effettuato il giorno alle ore circa.

Documentazione richiesta:

- Richiesta medica per "**SCINTIGRAFIA OSSEA TOTAL BODY**" - (cod. richiesta **9E81**)
 - Solo per i pazienti che hanno fatto terapia con **Xofigo**:
- richiesta medica per "**SCINTIGRAFIA OSSEA TOTAL BODY post terapia con traccianti a tropismo osseo**" - (cod. richiesta **9E82**)
 - Eventuali precedenti esami scintigrafici scheletrici
 - Eventuali esami radiografici o di laboratorio utili ai fini diagnostici
- Attenzione:** ai sensi della normativa vigente, nella richiesta medica deve essere indicato un **QUESITO CLINICO**; in caso di mancata indicazione diagnostica l'esame non verrà effettuato.

Preparazione:

- L'esame non necessita preparazione.
- Non è necessario il digiuno, né la sospensione di eventuali terapie.
- L'esame è contrindicato in gravidanza

Utilità:

L'esame serve ad identificare aree di rimaneggiamento osseo sedi di manifestazioni ripetitive scheletriche o di manifestazioni infiammatorie, degenerative o di traumi.

Procedura:

Dopo avere effettuato un colloquio con il medico, Le verrà somministrato per via endovenosa il radiofarmaco, necessario per l'esecuzione dell'esame. L'acquisizione delle immagini inizierà dopo circa 3 ore (periodo necessario per permettere al tracciante iniettato di localizzarsi a livello osseo); in questo periodo dovrà attendere in una sala di attesa apposita dalla quale non sarà permesso uscire fino al completamento dell'esame.

L'esame scintigrafico vero e proprio avrà una durata di circa 30/40 minuti durante i quali il Paziente dovrà rimanere sdraiato sul lettino di acquisizione, senza muoversi.

Tollerabilità:

Di norma l'esame è ottimamente tollerato e non determina sintomi o effetti collaterali.

La dose radioattiva somministrata è minima; si consiglia comunque di evitare il contatto con bambini o con donne in gravidanza per il giorno dell'esame e il successivo.

Referto:

Disponibile, in genere, dopo otto giorni dal termine dell'esame.