

**Azienda USL Toscana sud est**

SEDE LEGALE: via Curtatone, 54 Arezzo 52100 Arezzo P.I. e C.F. 02236310518  
SEDE OPERATIVA GROSSETO: via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto  
P.O. Misericordia Grosseto U.O.S.D. Medicina Nucleare tel. 0564485032  
fax (0564) 485476 e-mail: [medicina.nucleare@uslsudest.toscana.it](mailto:medicina.nucleare@uslsudest.toscana.it)  
**DIRETTORE DR.SSA LUCIA LELLI**

**SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE (senza soppressione)**

Grosseto, .....

SIGNOR .....

L'esame richiesto verrà effettuato il giorno ..... alle ore ..... circa.

**Documentazione richiesta:**

- Richiesta medica per "SCINTIGRAFIA CORTICOSURRENALICA".
- Esami diagnostici effettuati (Ecografie addominali, TC, RMN, precedenti scintigrafie, ecc.) inerenti al quesito clinico.
- Dosaggio di Aldosterone, Cortisolo, ACTH, elettroliti plasmatici, catecolamine plasmatiche.

**Attenzione:** ai sensi della normativa vigente, nella richiesta medica deve essere indicato un **QUESITO CLINICO** o comunque il motivo per cui si richiede la scintigrafia; in caso di mancata indicazione diagnostica l'esame non verrà effettuato.

**Preparazione:**

Deve essere seguito scrupolosamente lo schema che viene allegato.

I seguenti farmaci devono essere sospesi, sentito il proprio medico di famiglia, almeno due giorni prima dalla somministrazione del tracciante (giorno 0):

- SPIRONOLATONE
- DIURETICI
- IPOCOLESTEROLEMIZZANTI
- CONTRACCETTIVI ORALI

Ppreferibile una dieta a basso contenuto di sodio e valori di colesterolo inferiori a 300 mg/dl.

**Utilità:**

L'esame serve a valutare condizioni caratterizzate da:

- Aumentata sintesi di cortisolo
- Aumentata sintesi di aldosterone
- Aumentata sintesi di ormoni surrenalici virilizzanti
- Neoformazioni surrenaliche di riscontro incidentale alla TC, ECO o RMN

**Procedura:**

Il primo giorno (giorno 0) verrà effettuata unicamente la somministrazione endovenosa del radiofarmaco al termine della quale il Paziente potrà lasciare la Medicina Nucleare.

Nei giorni indicati verrà effettuata la registrazione scintigrafica durante la quale il Paziente dovrà rimanere immobile sul lettino per tutta la durata dell'acquisizione (in media 30 minuti).

**Tollerabilità:**

Di norma l'esame è ottimamente tollerato e non determina sintomi o effetti collaterali. La dose radioattiva somministrata è minima; si consiglia comunque di evitare il contatto con bambini o con donne in gravidanza per il giorno dell'esame e il successivo.

**Referto:**

Disponibile, in genere, dopo otto giorni dal termine dell'esame.