

INDICAZIONI ALL'INSTILLAZIONI ENDOVESCICALI CON BCG

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: Le instillazioni endovesicali prevedono la somministrazione in vescica, mediante un catetere vescicale di piccolo calibro, di un farmaco (BCG - Bacillus Calmette Guerin) secondo un programma terapeutico ben definito; tale farmaco introdotto in vescica stimola una reazione immunitaria locale che contrasta o limita la recidiva di tumore vescicale superficiale. La procedura non è dolorosa; il disagio è legato all'introduzione del catetere in vescica. La procedura in toto richiede meno di cinque minuti. La terapia deve iniziare non prima di 30/40 giorni dall'intervento endoscopico; e prevede una **prima fase di INDUZIONE** di n°6 instillazioni endovesicali ambulatoriali con cadenza settimanale. Dopo 30/40 giorni dall'ultima instillazione viene eseguita una cistoscopia di controllo, se questa è negativa è previsto una **seconda fase di MANTENIMENTO** con insillazioni endovesicali mensili durante il quale saranno eseguite Cistoscopie Ambulatoriali periodiche.

In assenza di recidive il trattamento sarà interrotto al 12° mese, dopo di che il Paziente entrerà in protocollo di Follow up che prevede :

- Ecografia vescicale e citologia urinaria ogni tre mesi
- Cistoscopia Ambulatoriale ogni sei mesi

DOVE SI ESEGUE: Le instillazioni endovesicali vengono eseguite presso l'ambulatorio di Urologia (Palazzina della libera professione - Stanza 10)

ORARI DI APERTURA AMBULATORIO: Dal Lun al Ven, dalle ore 08.00 alle ore 13.00

COME SI ACCEDE: L'instillazione endovesicale viene suggerita alla consegna dell'esame istologico a seguito di una visita presso il GOM (gruppo oncologico multidisciplinare)

Con la richiesta dello specialista, il paziente deve recarsi presso l'ambulatorio di Urologia per l'inserimento del piano terapeutico e presso il CUP per prenotare il trattamento secondo le indicazioni.

Tel. CUP (800.500.483 numero verde gratuito, 199.100.483 per le chiamate da cellulare, 0564/972190 per chi chiama da numero fisso da fuori provincia di Grosseto.).

Per pazienti operati presso altre strutture l'accesso alla terapia è subordinata alla verifica dello specialista di Urologia presso l'ambulatorio divisionale previa prenotazione.

QUANTO COSTA: nessun costo aggiuntivo

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO : prima dell'instillazione informare il Medico Curante perchè associazioni con farmaci che possono determinare depressione dell'attività del

INDICAZIONI ALL'INSTILLAZIONI ENDOVESCICALI CON BCG

midollo e/o immunodepressivi e/o radioterape possono interferire con il meccanismo d'azione del BCG

-Assunzione di fluorchinolonico 500 mg iniziando dalla sera precedente e proseguendo nelle 24h successive (o altro antibiotico attivo a giudizio del medico curante in caso d'intolleranza/allergia/insuff. Renali o altre eventuali controindicazioni)

-Ad ogni instillazione è necessario presentarsi con la vescica vuota.

Non è richiesto il digiuno ma si consiglia nelle 4 ore prima dell'instillazione di non mangiare o bere qualsiasi cosa contenente caffeina (caffè, tè, cioccolat, alcolici,) perchè possono irritare la vescica.

COME VIENE SOMMINISTRATA

-La manovra non è dolorosa. Prima di iniziare la procedura dovrà urinare. Dopo si stenderà su un lettino e un medico procederà ad iniettare il farmaco (preparato presso il laboratorio oncologico UFA) dentro la sua vescica attraverso un catetere vescicale; terminata l'instillazione il catetere verrà tolto e lei potrà tornare a casa.

Dovrà trattenere il farmaco in vescica per due ore, se riesce: ma non di più !

Durante questo periodo il liquido instillato deve venire a contatto con tutta la mucosa vescicale. Perciò dovrà alternare diverse posizioni: in piedi e disteso girandosi sul fianco destro, sinistro, supino e prono ogni 15 minuti.

PRECAUZIONI DOPO L'INSTILLAZIONE

-Evitare di urinare in luoghi pubblici nelle ore successive all'instillazione.

-Poichè il BCG è potenzialmente infettante sarebbe opportuno evitare l'utilizzo del WC ad altre persone del prima che sia adeguatamente disinfettato .Per le prime 5/6 ore dopo il trattamento versare una tazza di candeggina nel water dopo aver urinato, lasciare agire per 15 minuti e risciacquare il water.

-Quando va ad urinare si metta seduto sulla toilette, per evitare di schizzare urina.

-Occorre lavarsi minuziosamente le mani e l'area genitale dopo aver urinato, ciò l'aiuterà ad evitare l'irritazione della cute che il farmaco può provocare

-Passate due ore dalla somministrazione del farmaco dovrà bere più del solito, almeno per le prime 24 ore, per pulire la vescica dai residui del farmaco.

-Non si deve affaticare per le prime 24 /48ore dopo l'instillazione vescicale.

-Qualora venga evidenziata un'infezione batterica delle vie urinarie prima o durante il trattamento, la terapia con BCG potrà essere interrotta, a giudizio Medico, fin quando l'infezione sarà completamente scomparsa

-Non ci sono noti gli effetti del BCG su donne in gravidanza. Informare il proprio Medico di riferimento sulla possibilità di eventuale gravidanza

INDICAZIONI ALL'INSTILLAZIONI ENDOVESCICALI CON BCG

-Le donne non devono allattare durante il trattamento

QUALI DISTURBI PUO' CAUSARE

In seguito all'utilizzo del BCG possano insorgere effetti indesiderati . Tali effetti sono per lo più controllabili e risultano più intensi nei giorni del trattamento mentre scompaiono nei giorni successivi . Avvisare il proprio medico qualora si verificano effetti indesiderati .

Sensazione di bruciore quando va ad urinare (dovuta all'irritazione provocata dal farmaco).

Frequenza ed urgenza ad urinare. Questi sintomi spesso si manifestano dalla seconda o terza instillazione in poi. In molti casi i sintomi scompaiono entro un paio di giorni senza alcuna terapia.

Presenza di sangue o frammenti di tessuto nelle urine dovuti all'azione del farmaco sulla mucosa vescicale.

Malessere, dolori muscolari, sintomi simil-influenzali con lieve rialzo della temperatura corporea; compaiono entro 4 ore dopo l'instillazione e durano per 24/48 ore.

Febbre elevata 38° / 39° con brividi durante le prime 24 ore; di solito si risolve prendendo del paracetamolo. Se la febbre persiste rivolgersi al medico. Questi sintomi possono essere causati dall'azione del farmaco oppure dal trauma provocato dalle manovre di cateterismo necessarie per l'instillazione.

COSA POSSO FARE DOPO L'INSTILLAZIONE

Dopo due ore dall'instillazione lei potrà condurre una vita normale, senza affaticarsi troppo per le prime 24 ore.

Dopo 24 ore lei potrà :

-Andare in bicicletta, fare passeggiate, fare lunghi viaggi, andare a ballare, esporsi al sole.

-Riprendere la sua attività lavorativa

-Riprendere la sua attività sessuale, usando, durante la settimana successiva all'instillazione, i profilattici.

Al termine del ciclo di instillazioni il medico responsabile provvederà a programmare i controlli per il follow-up della malattia.

Per qualsiasi problema è comunque possibile telefonare al seguente numero:

INDICAZIONI ALL'INSTILLAZIONI ENDOVESCICALI CON BCG

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13
Ambulatorio di Urologia
Tel 0564483332

negli altri giorni e orari allo
0564485434, 0564485008, 0564485170.